- Il trattamento del singolo episodio non deve superare le due settimane;
- L'impiego nella malattia diverticolare sintomatica, in assenza di diarrea non è concedibile dal SSN;
- L'uso ciclico periodico della Rifaximina non ha indicazione nella malattia diverticolare asintomatica come profilassi della diverticolite.

**RIFAXIMINA 500 mg: Indicazioni**

Riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età > _ 18 anni .

La prescrizione della suddetta specialità medicinale è soggetta a Piano Terapeutico, redatto dalle UU.OO di Gastroenterologia, Infettivologia, Medicina interna, Epatologia delle strutture ospedaliere, territoriali o convenzionate con il SSN. La dispensazione è effettuata dalle farmacie private tramite il canale DPC.

**MESALAZINA:Indicazioni**

- **Compresse**: Colite ulcerosa e Morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive;
- **Sospensione rettale:** Colite ulcerosa nella localizzazione a livello retto-sigmoideo, trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive
- **Supposte:** Colite ulcerosa nella localizzazione a livello rettale, trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive
  Nelle fasi attive di grado severo è consigliabile l'associazione con cortisonici.

**Le indicazioni non previste in scheda tecnica sono da considerare in off-label e quindi a carico della struttura prescrittrice o del paziente, dopo acquisizione del consenso informato.**
Si invitano i Prescrittori a valutare la miglior terapia possibile sulla base di considerazioni cliniche di sicurezza, efficacia e sostenibilità economica.

Il Referente Aziendale Appropriatezza Prescrittiva — Il Direttore UOC Gestione Farmaci

Il Resp. UOS Farmacoeconomia – Farmacovigilanza — ( Dott. Giuseppe Caruso)

(Dottssa Salvina Schiavone)

***"FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D. Lsv. N. 39 DEL 12.02.1993. L'ORIGINALE DEL DOCUMENTO E' AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO".***